

レジメン名	薬品名	投与量	投与時間	投与方法	投与日	前投薬	インターバル
(子宮体)GEM	ゲムシタビン	800mg/m ²	30分	点滴静注	Day1,8	軽度催吐リスクレジメン	21日
(子宮体)Pembrolizumab + Lenvatinib	ペムブロリズマブ	800mg	30分	点滴静注	Day1	なし	21日
	レンバチニブ	20mg		経口	Day1-21		
(子宮肉腫)ADM	ドキシソルビン	800mg/m ²	30分	点滴静注	Day1	中等度催吐リスクレジメン	21日
(子宮肉腫)Eribulin	エリブリン	1.4mg/m ²	6分	点滴静注	Day1	軽度催吐リスクレジメン	21日
(子宮肉腫)GEM + DOCE	ゲムシタビン	800mg/m ²	30分	点滴静注	Day1,8	中等度催吐リスクレジメン	21日
	ドセタキセル	80mg/m ²	1時間	点滴静注	Day8		
(卵巣)BEV	ベバシズマブ	15mg/kg	初回90分	点滴静注	Day1	なし	21日
(卵巣)BEV + Olaparib	ベバシズマブ	15mg/kg	初回90分	点滴静注	Day1	なし	21日
	オラパリブ	600mg		経口	Day1-21		
(卵巣)BEV + NGT	ベバシズマブ	15mg/kg	初回90分	点滴静注	Day1	軽度催吐リスクレジメン	21日
	ノギテカン	1.25mg/m ²	30分	点滴静注	Day1-5		
(卵巣)BEV + PLD	ベバシズマブ	10mg/kg	初回90分	点滴静注	Day1	軽度催吐リスクレジメン	28日
	ドキシル	40mg/m ²	90分	点滴静注	Day1,15		
(卵巣)CDGP	ネダブラテン	100mg/m ²	2時間	点滴静注	Day1	中等度催吐リスクレジメン	28日
(卵巣)CD(CBDCA + PLD)	ドキシル	30mg/m ²	1時間	点滴静注	Day1	高度催吐リスクレジメン	28日
	カルボプラチン	AUC5	1時間	点滴静注	Day1		
(卵巣)DTX	ドセタキセル	70mg/m ²	1時間	点滴静注	Day1	軽度催吐リスクレジメン	21日
(卵巣)TC + BEV	バクリタキセル	175mg/m ²	3時間	点滴静注	Day1	高度催吐リスクレジメン	21日
	カルボプラチン	AUC6	1時間	点滴静注	Day1		
	ベバシズマブ	15mg/kg	初回90分	点滴静注	Day1		
(卵巣)dd-TC	バクリタキセル	80mg/m ²	1時間	点滴静注	Day1,8,15	高度催吐リスクレジメン	21日
	カルボプラチン	AUC6	1時間	点滴静注	Day1		
(卵巣)dd-TC + BEV	バクリタキセル	80mg/m ²	1時間	点滴静注	Day1,8,15	高度催吐リスクレジメン	21日
	カルボプラチン	AUC6	1時間	点滴静注	Day1		
	ベバシズマブ	7.5mg/kg	初回90分	点滴静注	Day1		
(卵巣)GEM	ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分	点滴静注	Day1,8,15	軽度催吐リスクレジメン	28日
(卵巣)GEM + CBDCA	ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分	点滴静注	Day1,8	高度催吐リスクレジメン	21日
	カルボプラチン	AUC4	1時間	点滴静注	Day1		
(卵巣)GEM + CBDCA + BEV	ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分	点滴静注	Day1,8	高度催吐リスクレジメン	21日
	カルボプラチン	AUC4	1時間	点滴静注	Day1		
	ベバシズマブ	15mg/kg	初回90分	点滴静注	Day1		
(卵巣)PLD	ドキシル	50mg/m ²	1時間30分	点滴静注	Day1	軽度催吐リスクレジメン	28日
(卵巣)DC(CBDCA + DOCE)	ドセタキセル	70mg/m ²	1時間	点滴静注	Day1	高度催吐リスクレジメン	21-28日
	カルボプラチン	AUC5	1時間	点滴静注	Day1		
(卵巣・子宮体)TC(CBDCA + PTX-括)	バクリタキセル	175mg/m ²	3時間	点滴静注	Day1	高度催吐リスクレジメン	21-28日
	カルボプラチン	AUC5 or 6	1時間	点滴静注	Day1		
(卵巣・子宮体)weekly DC	ドセタキセル	30mg/m ²	1時間	点滴静注	Day1,8,15	高度催吐リスクレジメン	28日
	カルボプラチン	AUC2	1時間	点滴静注	Day1,8,15		
(卵巣・子宮体)weekly DOCE	ドセタキセル	30mg/m ²	1時間	点滴静注	Day1,8,15	軽度催吐リスクレジメン	28日
(卵巣・子宮体)weekly PTX	バクリタキセル	80mg/m ²	1時間	点滴静注	Day1,8,15	軽度催吐リスクレジメン	28日
(卵巣・子宮体)weekly TC	バクリタキセル	80mg/m ²	1時間	点滴静注	Day1,8,15	高度催吐リスクレジメン	28日
	カルボプラチン	AUC2	1時間	点滴静注	Day1,8,15		
(絨毛癌)MTX + FA	メトトレキサート	1mg/kg		筋注	Day1,3,5,7	なし	14日
	ロイコポリン	0.1mg/kg		筋注	Day2,4,6,8		
(絨毛癌)biweekly Act-D	アクチノマイシシD	1.25mg/m ²	30分	静注	Day1	中等度催吐リスクレジメン	14日
(絨毛癌)weekly MTX	メトトレキサート	40-50mg/m ² (40mg/m ² より開始)		筋注	Day1	なし	7日
(絨毛癌)conventional MTX	メトトレキサート	0.4mg/kg		筋注	Day1-5	なし	14日
(頭癌・卵巣)weekly CPT-11	イリノテカン	100mg/m ²	1時間30分	点滴静注	Day1,8,15	中等度催吐リスクレジメン	28日
(頭癌)CDGP	ネダブラテン	100mg/m ²	2時間	点滴静注	Day1	中等度催吐リスクレジメン	28日
(頭癌)CPT-11 + CDGP	イリノテカン	60mg/m ²	1時間30分	点滴静注	Day1,8,15	中等度催吐リスクレジメン	28日
	ネダブラテン	60mg/m ²	2時間	点滴静注	Day1		
(頭癌)GEM	ゲムシタビン	800mg/m ²	30分	点滴静注	Day1,8,15	軽度催吐リスクレジメン	28日
Cemiplimab	セミプリマブ	350mg/body	30分	点滴静注	Day1	なし	21日