

肝胆腫

レジメン名	薬品名	投与量	投与時間	投与方法	投与日	前投薬	インターバル
modified FOLFIRINOX	オキサリプラチン	85mg/m ²	2時間	点滴静注	Day1	高度催吐リスクレジメン	14日
	イリノテカン	150mg/m ²	2時間	点滴静注	Day1		
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間	持続静注	Day1		
	レボホリナート	200mg/m ²	2時間	点滴静注	Day1		
FF+nal-IRI	イリノテカン (リポソーム製剤)	70mg/m ² <small>(イリノテカンとして)</small>	90分	点滴静注	Day1	中等度催吐リスクレジメン	14日
	レボホリナート	200mg/m ²	2時間	点滴静注	Day1		
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間	持続静注	Day1		
GEM	ゲムシタビン	100mg	30分	点滴静注	Day1,8,15	軽度催吐リスクレジメン	28日
Tarceva+GEM	エルロチニブ	1000mg/m ²		経口	Day1から連日	軽度催吐リスクレジメン	28日
	ゲムシタビン	600mg	30分	点滴静注	Day1,8,15		
nab-PTX+GEM	アルブミン懸濁型パクリタキセル	125mg/m ²	30分	点滴静注	Day1,8,15	中等度催吐リスクレジメン	28日
	ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分	点滴静注	Day1,8,15		
GEM+CDDP	ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分	点滴静注	Day1,8	高度催吐リスクレジメン	21日
	シスプラチン	25mg/m ²	1時間	点滴静注	Day1,8		
GEM+CDDP+S1	ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分	点滴静注	Day1	高度催吐リスクレジメン	14日
	シスプラチン	25mg/m ²	1時間	点滴静注	Day1		
	S-1	添付文書参照		経口	Day1-7		
S1+GEM	ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分	点滴静注	Day1,15	軽度催吐リスクレジメン	21日
	S-1	添付文書参照		経口			

(NET) STZ weekly	ストレプトゾシン	100mg/m ²	30分	点滴静注	Day1	中等度催吐リスクレジメン	7日
(NET) UFT+STZ weekly	ストレプトゾシン	100mg/m ²	30分	点滴静注	Day1	中等度催吐リスクレジメン	7日
	UFT	300-600mg		経口	Day1-7		
RAM	ラムシルマブ	8mg/kg	1時間	点滴静注	Day1	d-クロルフェニラミン	14日
Atezolizumab+BEV	アテゾリズマブ	1200mg	1時間	点滴静注	Day1	なし	21日
	ベバシズマブ	15mg/kg	初回90分	点滴静注	Day1		
Durvalumab+GEM+CDDP	ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分	点滴静注	Day1,8	高度催吐リスクレジメン	21日
	シスプラチン	25mg/m ²	1時間	点滴静注	Day1,8		
	デュルバルマブ	1500mg/body	1時間	点滴静注	Day1		
Durvalumab	デュルバルマブ	1500mg/body	1時間	点滴静注	Day1	なし	28日
Durvalumab+Tremelimumab	デュルバルマブ	1500mg/body	1時間	点滴静注	Day1	なし	28日
	トレメリムマブ	300mg/body	1時間	点滴静注	Day1		