							2023年4月改訂
レジメン名	薬品名	投与量	投与時間	投与方法	投与日	前投薬	インターバル
5-FU+LV	フルオロウラシル	500mg/m²	6分	点滴静注	Day1,8,15,22, 29,36	軽度催吐用レジメン	56⊟
	レポホリナート	250mg/m²	2時間	点滴静注	Day1,8,15,22, 29,36	社及住吐用レンバン	3011
AFLI+FOLFIRI	アフリベルセプト	4mg/kg	1時間	点滴静注	Day1	高度催吐用レジメン	14日
	イリノテカン	150mg/m²	2時間	点滴静注	Day1		
	レポホリナート	200mg/m²	2時間	点滴静注	Day1		
	フルオロウラシル	400mg/m²	6分	点滴静注	Day1		
	フルオロウラシル	2400mg/m²	46時間	点滴静注	Day1		
BV+FOLFIRI	ベバシズマブ	5mg/kg	初回) 90分,2回日) 60分 3回日以降) 30分	点滴静注	Day1	高度催吐用レジメン	14日
	イリノテカン	150mg/m²	2時間	点滴静注	Day1		
	レポホリナート	200mg/m²	2時間	点滴静注	Day1		
	フルオロウラシル	400mg/m²	6分	点滴静注	Day1		
	フルオロウラシル	2400mg/m²	46時間	点滴静注	Day1		
	ベバシズマブ	5mg/kg	初回) 90分,2回日) 60分 3回日以降) 30分	点滴静注	Day1		14日
	オキサリプラチン	85mg/m²	2時間	点滴静注	Day1		
BV + FOLFOXIRI	イリノテカン	165mg/m²	2時間	点滴静注	Day1	高度催吐用レジメン	
	レポホリナート	200mg/m²	2時間	点滴静注	Day1		
	フルオロウラシル	2400mg/m²	48時間	点滴静注	Day1		
	ベバシズマブ	5mg/kg	初回) 90分,2回日) 60分 3回日以降) 30分	点滴静注	Day1,15		28日
BV+IRIS	イリノテカン	100mg/m²	90分	点滴静注	Day1,15	中等度催吐用レジメン	
	S-1	80~120mg/m²		内服	Day1~14		
	ベバシズマブ	5mg/kg	初回) 90分,2回日) 60分 3回日以降) 30分	点滴静注	Day1	高度催吐用レジメン	14日
	オキサリプラチン	85mg/m²	2時間	点滴静注	Day1		
BV+mFOLFOX6	レポホリナート	200mg/m²	2時間	点滴静注	Day1		
	フルオロウラシル	400mg/m²	6分	点滴静注	Day1		
	フルオロウラシル	2400mg/m²	46時間	点滴静注	Day1		
	ベバシズマブ	5mg/kg	初回) 90分,2回目) 60分 3回目以降) 30分	点滴静注	Day1	軽度催吐用レジメン	14日
BV+sLV5FU2	レポホリナート	200mg/m²	2時間	点滴静注	Day1		
BV 1 3EV31 02	フルオロウラシル	400mg/m²	6分	点滴静注	Day1		
	フルオロウラシル	2400mg/m²	46時間	点滴静注	Day1		
	ベバシズマブ	7.5mg/kg	初回) 90分,2回日) 60分 3回日以降) 30分	点滴静注	Day1,15	中等度催吐用レジメン	21日
BV + CapeIRI	イリノテカン	200mg/m²	90分	点滴静注	Day1,15		
	カペシタビン	1600mg/m²		内服	Day1~14		
	ベバシズマブ	7.5mg/kg	初回) 90分,2回日) 60分 3回日以降) 30分	点滴静注	Day1,15	中等度催吐用レジメン	21日
BV + CapeOX	オキサリブラチン	130mg/m²	2時間	点滴静注	Day1,15		
	カペシタビン	2000mg/m²		内服	Day1~14		
BV+FTD/TPI	ベバシズマブ	5mg/kg	初回) 90分,2回日) 60分 3回日以降) 30分	点滴静注	Day1,15		28日
BV+FID/IPI	TAS-102	70mg/m²		内服	Day1~5,8~12		28日
biweekly CPT-11	イリノテカン	150mg/m²	90分	点滴静注	Day1	中等度催吐用レジメン	14日
Cetuximab	セツキシマブ	初回)400mg/m² 2回日以降)250mg/m²	初回)2時間 2回目以降)1時間	点滴静注	Day1	デキサメタゾン d-クロルフェニラミン	7日
Cmoh : 2:::CDT 11	セツキシマブ	初回) 400mg/m² 2回目以降) 250mg/m²	初回)2時間 2回目以降)1時間	点滴静注	Day1,8	中等度催吐用レジメン	20 🗆
Cmab+2wCPT-11	イリノテカン	150mg/m²	90分	点滴静注	Day1		28⊟
Cmab+CPT-11 (biweekly)	セツキシマブ	500mg/m²	初回)2時間 2回目以降)1時間	点滴静注	Day1	パロノセトロン	140
	イリノテカン	150mg/m²	90分	点滴静注	Day1	デキサメタゾン d-クロルフェニラミン	14日
Cmab+FOLFIRI	セツキシマブ	初間) 400mg/m² 2回目以降) 250mg/m²	初回)2時間 2回目以降)1時間	点滴静注	Day1,8	高度催吐用レジメン d-クロルフェニラミン	14日
	イリノテカン	150mg/m²	2時間	点滴静注	Day1		
	レポホリナート	200mg/m²	2時間	点滴静注	Day1		
	フルオロウラシル	400mg/m²	6分	点滴静注	Day1		
	フルオロウラシル	2400mg/m²	46時間	点滴静注	Day1		

	bw+>.→	初間) 400mg/m²	初回)2時間	上海水	D. 10	T	
Cmab + mFOLFOX6	セツキシマブ 	2回日以降) 250mg/m²	2回目以降)1時間	点滴静注	Day1,8		
	オギサリファチン 	85mg/m² 200mg/m²	2時間	点滴静注	Day1	高度催吐用レジメン	14⊟
			2時間		Day1	d-クロルフェニラミン	14口
	フルオロウラシルフルオロウラシル	400mg/m²	6分	点滴静注	Day1		
	セツキシマブ	2400mg/m ² 500mg/m ²	46時間 初回) 2時間	点滴静注	Day1		
	イリノテカン	150mg/m²	2回目以降) 1時間 2時間	点滴静注	Day1 Day1		
Cmab+FOLFIRI (biweekly)	レポホリナート	200mg/m²	2時間	点滴静注		高度催吐用レジメン d-クロルフェニラミン	14日
	フルオロウラシル	400mg/m²	6分	点滴静注	Day1 Day1		
	フルオロウラシル	2400mg/m²	46時間	点滴静注	Day1		
	セツキシマブ	500mg/m²	初回)2時間	点滴静注	Day1		
	オキサリプラチン	85mg/m ²	2回目以降) 1時間 2時間	点滴静注	Day1		14日
Cmab + mFOLFOX6 (biweekly)	レポホリナート	200mg/m ²	2時間	点滴静注	Day1	高度催吐用レジメン	
Childs I fill OEI ONG (blweckly)	フルオロウラシル	400mg/m ²	6分	点滴静注	Day1	d-クロルフェニラミン	
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間	点滴静注	Day1		
	セツキシマブ	500mg/m²	初回)2時間	点滴静注	Day1		
	オキサリプラチン	85mg/m²	2回目以降) 1時間 2時間	点滴静注	Day1 Day1		
Cmab (biweekly) +mFOLFOXIRI	イリノテカン	130mg/m²	2時間	点滴静注	Day1	高度催吐用レジメン	14日
,	レポホリナート	200mg/m ²	2時間	点滴静注	Day1	d-クロルフェニラミン	
	フルオロウラシル	2400mg/m²	48時間	点滴静注	Day1		
	セツキシマブ	初回) 400mg/m² 2回日以降) 250mg/m²	初回)2時間	点滴静注	Day1		
Cmab + Encorafenib+Binimetinib	エンコラフェニブ	300mg/body	2回目以降)1時間	内服	連日	デキサメタゾン	7日
	ビニメチニブ	90mg/body		内服	連日	d-クロルフェニラミン	
	セツキシマブ	初回) 400mg/m² 2回日以降) 250mg/m²	初回)2時間	点滴静注	Day1	デキサメタゾン	
Cmab + Encorafenib	エンコラフェニブ	300mg/body	2回目以降)1時間	内服	連日	d-クロルフェニラミン	7日
	イリノテカン	150mg/m²	2時間	点滴静注	Day1	高度催吐用レジメン	14日
	レポホリナート	200mg/m²	2時間	点滴静注	Day1		
FOLFIRI	フルオロウラシル	400mg/m²	6分	点滴静注	Day1		
	フルオロウラシル	2400mg/m²	46時間	点滴静注	Day1		
	オキサリプラチン	85mg/m²	2時間	点滴静注	Day1	高度催吐用レジメン	14日
	レポホリナート	200mg/m²	2時間	点滴静注	Day1		
mFOLFOX6	フルオロウラシル	400mg/m²	6分	点滴静注	Day1		
	フルオロウラシル	2400mg/m²	46時間	点滴静注	Day1		
	ラムシルマブ	8mg/kg	1時間	点滴静注	Day1	高度催吐用レジメン d-クロルフェニラミン 中等度催吐用レジメン	28日
	イリノテカン	150mg/m²	2時間	点滴静注	Day1		
RAM + FOLFIRI	レボホリナート	200mg/m²	2時間	点滴静注	Day1		
	フルオロウラシル	400mg/m²	6分	点滴静注	Day1		
	フルオロウラシル	2400mg/m²	46時間	点滴静注	Day1		
C1 - OPT 11	イリノテカン	100~150mg/m²	90分	点滴静注	Day1,15		
S1+CPT-11	S-1	80~120mg/m²		内服	Day1~14		
	レポホリナート	200mg/m²	2時間	点滴静注	Day1		14日
sLV5FU2	フルオロウラシル	400mg/m²	6分	点滴静注	Day1	軽度催吐用レジメン	
	フルオロウラシル	2400mg/m²	46時間	点滴静注	Day1		
C0V	オキサリプラチン	130mg/m²	2時間	点滴静注	Day1,15	中等度催吐用レジメン	21日
CpeOX	カペシタビン	2000mg/m²		内服	Day1~14		
Pmab	パニツムマブ	6mg/kg	1時間	点滴静注	Day1		14日
Pmab+2wCPT-11	パニツムマブ	6mg/kg	1時間	点滴静注	Day1	中等度催吐用レジメン	14日
	イリノテカン	150mg/m²	90分	点滴静注	Day1		
Pmab+FOLFIRI	パニツムマブ	6mg/kg	1時間	点滴静注	Day1	高度催吐用レジメン	14日
	イリノテカン	150mg/m²	2時間	点滴静注	Day1		
	レポホリナート	200mg/m²	2時間	点滴静注	Day1		
	フルオロウラシル	400mg/m²	6分	点滴静注	Day1		
	7 N 3 H 7 7 7 N	1001118/111	073	71(7)(d H3 72	50,1	l	

Pmab+mFOLFOX6	パニツムマブ	6mg/kg	1時間	点滴静注	Day1	高度催吐用レジメン	14日
	オキサリプラチン	85mg/m²	2時間	点滴静注	Day1		
	レポホリナート	200mg/m²	2時間	点滴静注	Day1		
	フルオロウラシル	400mg/m²	6分	点滴静注	Day1		
	フルオロウラシル	2400mg/m²	46時間	点滴静注	Day1		
FP	シスプラチン	80mg/m²	2時間	点滴静注	Day1	高度催吐用レジメン	28日
	フルオロウラシル	800mg/m²	24時間	点滴静注	Day1~5		
MMC+5-FU+RT	マイトマイシンC	10mg/m²	6分	点滴静注	Day1,29	高度催吐用レジメン	42日
	フルオロウラシル	1000mg/m²	24時間	点滴静注	Day1~4,29~32		
Nivolumab	ニボルマブ	240mg/body	30分	点滴静注	Day1		14日
Nivo+lpi	ニボルマブ	240mg/body	30分	点滴静注	Day1		21日
	イビリムマブ	1mg/kg	30分	点滴静注	Day1		
(NEC) CPT-11+CDDP	イリノテカン	60mg/m²	90分	点滴静注	Day1,8,15	高度催吐用レジメン	28日
	シスプラチン	60mg/m²	2時間	点滴静注	Day1		
(NEC) ETP+CDDP	エトポシド	100mg/m²	2時間	点滴静注	Day1~3	高度催吐用レジメン	28日
	シスプラチン	80mg/m²	2時間	点滴静注	Day1		
(NEC) CBDCA+ETP	エトポシド	100mg/m²	1時間	点滴静注	Day1~3	高度催吐用レジメン	28日
	カルボプラチン	AUC5	1時間	点滴静注	Day1		

帝京大学医学部附属病院薬剤部